

Igényeim:	
Fény	Félárnyékos, árnyékos helyeket kedvelek, tűző napra, megfelelő öntözés biztosításával szintén ültethetsz.
Víz	Páraigényes és vízigényes vagyok. Normál, gondozott díszkertben, díszparkban jól érzem magam.
Hőmérséklet	A magyarországi teleket jól bírom, nyári kánikulában is helytállok, megfelelő öntözés biztosítása mellett.
Talaj	Jó minőségű, tápanyagban gazdag, jó vízáteresztő képességű talajt előnyben részesítem! Meszes talajt nem kedvelem!
Egyéb	Virágaim édesen illatosak. Nyírást is tűröm.

Felhasználásom:

Kúszó / Pergola

Pergolák, rácsok, lugasok vagy magányosan álló oszlopok befuttatására, fedésére, takarására kiválóan megfelelek.
A falfelületeket is szépen befutom és takarom 10-15 méter magasságig használhatsz erre a célra is.

Sövény

Kerítésre vagy más funkciójú, hosszú szerkezetre futtatva, sövényként vagyok használható.

Talajtakaró

Kúszónövény vagyok, ám támaszték nélkül fedem a talajt, vagy bokor formát veszek fel, függően attól, hogyan nevelsz.

Betegségeim, kártevőim

Az előzőekben részletezett igényeim biztosítása esetén, normál díszkerti viszonyok között betegségek, kártevők nem támadnak.

A leírásban szerepel, hogy mészkérülő vagyok, amennyiben meszes talajon találok magam, úgy levélsárgulás jelentkezik, amit vaskelátos beöntözéssel kezelhetsz.

Nem megfelelő körülmények között tartva megjelenhetnek rajtam kártevők és betegségek is:

Takácsatka (Tetranychus urticae)



Levelem fonákán szívogat. A károsított leveleim kezdetben az erek mentén, a szívogatás hatására sárgulnak, majd megbarnulnak, és idő-előtt lehullnak. Aztán a takácsatkára jellemző pókhálószerű szövedék lesz látható.

⇒Vegyszeres védekezés:

Az atkákat észlelve ajánlatos azonnal elkezdni védekezni, használható a Fulmite 200, a Sanmite 20 WP speciális atkaölő szerek valamelyike. Ezek hosszú hatástartamú (40-60 nap) atkaölő szerek, ezért jól időzítve lehet, hogy elég egy évben egyszer (április-május) elvégezni a permetezést. Szükség esetén a következő kezeléshez váltott szert használj!

Hortenzia lisztharmat (Oidium hortensiae)



Levelem színén a lisztharmatra nem jellemző, kör alakú, sárgás-fehér folt jelenik meg, amit csak hosszabb idő elteltével követ a levél fonákomon jelentkező, jellegzetes lisztharmat, amely esetenként az egész levélfelületemet is beboríthatja.

Erős fertőzés esetén, már augusztusban elveszthetem lombozatomat.

⇒**Védekezés**

Megjelenése kezdetén védekezhetsz a fertőzött levelek eltávolításával, elégetésével.

⇒**Vegyszeres védekezés**

Erős fertőzés esetén, kéthetente lisztharmat elleni gombaölő szerrel szükséges permetezned, különösen ajánlott ez ott, ahol nagyobb állományomat tartasz fenn.

Fontos ősze, és kora tavasszal lemosó-permetezésben részesítened, ehhez a **Mészkénlé**, a **Nevikén** és a **Novenda** lemosó-permetezőszerek valamelyike használható.